




بنام خداوند جان و خرد  
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا  
بخش آموزش به بیمار

**واکسیناسیون  
نوزادان**



آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،  
بیمارستان دنا

تلفن: 36490411-17

فاکس: 36490433



www.denahospital.com



**کارت مراقبت کودک** (تذخیزه، واکسیناسیون، پایش رشد)

چهار دختران: شماره پرونده، نام و نام خانوادگی کودک، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولد روز، ماه، سال

وزن هنگام تولد (بر حسب گرم)، قد هنگام تولد (بر حسب سانتیمتر)، دور سر هنگام تولد (بر حسب سانتیمتر)، کودک چندمین فرزند زنده مادر است؟، فاصله کودک با فرزند زنده قبلی مادر (بر حسب ماه)، نوع زایمان: طبیعی  سزارین  پدید آید  نرم  ترس  خیس  سایر: .....

استان: ....., شهرستان: ....., مرکز بهداشتی درمانی: ....., خانه بهداشت: ....., تیم سیار: ....., نشانی منزل: ....., تلفن منزل: ....., سایر نکات: .....

در هر مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی یا مطب کارت مراقبت کودک را همراه داشته باشید.  
شیر مادر به تنهایی تا پایان ماه ششم ادامه آن تا پایان سال دوم برای رشد طبیعی شیرخوار ضروری است.

**با واکسیناسیون به موقع سلامت کودک خود را تضمین کنید.**

نوع واکسن	نوع واکسن	نوع واکسن	نوع واکسن
جدول واکسیناسیون کودکان	جدول واکسیناسیون کودکان	جدول واکسیناسیون کودکان	جدول واکسیناسیون کودکان

شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	واکسیناسیون نوزادان
تهیه کننده و ناظر کیفی	دفتر آموزش به بیمار
پزشک تأیید کننده	دکتر عبدالوهاب البرزی
تدوین کننده	مهندس سهیل هوشداران
بازنگری	بهار 1400
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع: برنامه واکسیناسیون کشوری



## واکسیناسیون نوزادان

ایمن‌سازی فعال یا واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است که به منظور پیش‌گیری از عفونت یا کاهش شدت بیماری با تجویز آنتی‌بادی (پادتن) یا آنتی‌ژن صورت گرفته و به کمک آن می‌توان با هزینه‌ی اندکی از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کرد. با اجرای برنامه‌ی واکسیناسیون همگانی در جهان شیوع بسیاری از بیماری‌های خطرناک در بین شیرخواران، کودکان و بالغین به‌شدت کاهش یافته است. به‌طوری‌که اکنون بیماری‌هایی مانند: دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه و فلج اطفال با موفقیت کنترل شده و در بسیاری از کشورها به کمترین میزان خود رسیده است. همچنین بیماری آبله با واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی به‌طور کامل ریشه‌کن شده است.

## کارت مراقبت کودک و روش استفاده از آن

در ایران هر کودک یک کارت مخصوص مراقبت کودک دارد که شامل جدول واکسیناسیون، تغذیه و روند رشد کودک می‌باشد. اگر فرزند شما این کارت را ندارد، در اولین فرصت به یکی از مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده‌ی محل زندگی خود مراجعه نمایید و برای او پرونده تشکیل داده و کارت مراقبت کودک را دریافت کنید.

واکسن	جلوگیری از بیماری	عوارض شایع
ب ث ژ (BCG)	سل	تاول پوستی بزرگ شدن غده لنفاوی زیربغل، بالای ترقوه سمت تزریق
فلج اطفال خوراکی (OPV)	فلج اطفال	عوارض شایع ندارد
فلج اطفال تزریقی (IPV)	فلج اطفال	تب خفیف، قرمزی، التهاب محل تزریق
هپاتیت ب (HepB)	هپاتیت ب	قرمزی و تورم در محل تزریق
پنج گانه (DTaP+HepB+) (Hib)	هموفیلوس آنفلوانزا سروتیپ b، دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه، هپاتیت ب	تورم، درد و قرمزی محل تزریق، تب، بی‌اشتهایی، تحریک پذیری، خستگی، رنگ پریدگی
MMR	سرخک، سرخچه، اوریون	تب، بی‌اشتهایی و علائم پوستی مثل قرمزی و راش‌های جلدی
سه گانه (DTP)	دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه	تب، تورم و التهاب

بهتر است واکسن هپاتیت B (دوز اول) برای همه کودکان ظرف 12 ساعت اول پس از تولد تزریق شود.

پس از واکسیناسیون

- برگه (های) اطلاعات واکسن را که پزشک کودک به شما داده است بخوانید تا در مورد عوارض جانبی که کودک شما تجربه می‌کند اطلاعات کسب کنید.
- تا انجائی که نوزاد تمایل به شیر دارد تغذیه شود. در صورت عدم تمایل با پزشک مشاوره شود.
- چند روزی به کودک خود بیشتر توجه کنید. اگر چیزی نگران کننده ای مشاهده کردید، با پزشک کودکتان تماس بگیرید.
- برای کمک به کاهش قرمزی، درد و / یا تورم در محل تزریق، از پارچه مرطوب و خنک استفاده کنید.
- در مورد روش کنترل تب، بعد از واکسیناسیون از پزشک خود سوال کنید.
- از دکتر کودک خود پرسید که آیا می‌توانید مسکن غیر آسپرین به کودک خود بدهید.