

بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

## فتق مغبنی (اینگوینال هرنا)



آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،


بیمارستان دنا

تلفن: 17-36490411

فاکس: 36490433



www.denahospital.com



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	فتق مغبنی
تهیه کننده	دکتر بنانی
سمت	پزشک جراح
سال تهیه	بهار 1400
ناظر کیفی	محدثه برومند
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع:

کتاب جراحی اطفال





3



2



4

مراجعه به مطب روز ششم یا هفتم پس از عمل می باشد .

فعالیت : پرهیز از پرش از بلندی

اجتناب از بلند کردن اجسام سنگین به مدت یک ماه

شنا ← 10 روز پس از عمل

والیبال - بسکتبال ← یک ماه پس از عمل

کشتی، فوتبال، ژیمناستیک ← 2 ماه پس از عمل



## آموزش های پس از ترخیص :

- 1- کودکان کمتر از 6 ماه قطره استامینوفن 4 قطره به ازاء هر کیلو وزن بدن هر 6 ساعت داده شود. ( در صورت تب و یا درد )
- 2- کودکان بالاتر از 6 ماه شربت استامینوفن 0.5 سی سی به ازاء هر کیلو وزن بدن هر 6 ساعت داده شود ( در صورت تب یا درد )
- 3- در صورت بی قراری شربت هیدروکسی زین نیم سی سی به ازاء هر کیلو وزن بدن 1 الی 2 بار در روز داده شود



تعویض پانسمان 3 روز پس از عمل انجام شود .

4- حمام از روز پنجم پس از عمل

5- تغذیه در شیرخواران :

الف) کمتر از زمان قبل از عمل در حد رفع گرسنگی در 24 ساعت اول

ب) غذا مانند قبل از عمل از روز دوم

- 6- غذا در کودکان بالاتر از 1 سال : در 24 ساعت اول مایعات در حد رفع گرسنگی داده شود و از روز دوم غذا مانند قبل از

1



## فتق مغبنی (اینگوینال هر نیا)

فتق یعنی باز بودن.

تمام انسان ها تا حدود ماه هفتم دوره جنینی پرده ای لوله شکل در پایین شکم (نزدیک کشاله ران در هر دو طرف) دارند. در حدود 80 تا 85% موارد، این پرده در ماه ه ششم و یا نهم جنینی بسته می شود. ولی در 15 تا 20% موارد، کودک (به ویژه در پسرها) پرده مذکور بسته نمی شود. و در هنگام تولد باز می ماند. این پرده لوله ای شکل اگر در حدی باز باشد که فقط آب وارد آن شود هیدروسل نامیده می شود ولی اگر عضوی مانند روده یا آپاندیس و یا در دخترها تخمدان در آن وارد شود، کودک مبتلا به فتق شده است که بایستی در اولین فرصت بصورت غیر اورژانس عمل شود.

اگر روده و تخمدان در کیسه فتق به نحوی قرار گیرد که برگشت پذیر نباشد ، فتق محتمل نامیده می شود که مورد اورژانسی است و مراجعه فوری به یزشک الزامی است .



## درمان :

درمان اساسی فتق مغبنی عمل جراحی و ترمیم بافت در جدار شکم است .

