

بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

کورتاژ تشخیصی




آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن: 36490411

فاکس: 36490433



شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	کورتاژ تشخیصی
تهیه کننده	مرضیه کمالی
سمت	کارشناس مامایی
پزشک تایید کننده	دکتر سرور
ناظر کیفی	م. برومند (سوپروایزر ارتقاء سلامت)
بازنگری	بهار 1400
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع:

مامایی و بیماری های زنان دنفورث



مراقبت های بعد از عمل:


پس از یک عمل کور تاژ بیمار از لحاظ بروز خونریزی شدید بررسی میشود.

اغلب خانمها در روز عمل مرخص میشوند و برخی دیگر در فردای آن روز مرخص شده و فعالیت های طبیعی روزانه را میتوان از سرگرفت.

ورزش های خشن و سنگین را نباید انجام داد. با بهبودی مریض واحد ساس راحتی، مقاربت های جنسی را میتوان از سرگرفت.

سیکل قاعدگی به طور معمول به خاطر کور تاژ تغییر نمی یابد و همه خونریزی های واژینال ممکن است در عرض یک هفته تا ده روز خاتمه یابد.

1. خونریزی تا هفت روز طبیعی است.
2. در صورت درد میتوان از کپسول مفنامیک اسید و یا قرص استامینوفن کدین استفاده کرد.
3. از فعالیتهای سنگین تا سه ماه جلوگیری کرد.
4. 48 ساعت پس از عمل میتوان جواب پاتولوژی را پیگیری و جواب را به مطب پزشک برد.



آندومتر رحم، لایه ای است که تحت تأثیر هورمون های تخمدان از جمله استروژن و پروژسترون قرار می گیرد. قاعدگی طبیعی در اثر کاهش سطح هورمون پروژسترون زمانی که آندومتر قبلاً تحت تأثیر استروژن قرار گرفته صورت می گیرد. هر سیکل قاعدگی دارای دو فاز است. فاز اول سیکل که آندومتر تحت تأثیر استروژن قرار می گیرد. فاز فولیکولار و فاز دوم سیکل که آندومتر بیشتر تحت تأثیر پروژسترون قرار می گیرد فاز ترشحات نام دارد. سیکل قاعدگی طبیعی معمولاً فواصل 28 الی 29 روز دارد، ولی فواصل بین 21 تا 37 روز را هم می توان طبیعی حساب کرد. مدت خونریزی به طور طبیعی هفت روز است و مقدار خونریزی بین 20 تا 80 میلی لیتر می باشد. هرگونه تغییری در میزان و مدت خونریزی طبیعی ماهانه باید بررسی شود. در مواردی که در خونریزی های غیر طبیعی، اختلال در عملکرد هورمونی مطرح است ابتدا درمان طبی با استفاده از داروهای هورمونی صورت می گیرد و در صورت عدم پاسخ به دارو یا رد شرایط پاتولوژیک دیگر، کور تاژ تشخیصی توصیه می شود.



کور تاژ چیست؟

کور تاژ تشخیصی یک روش تشخیصی_درمانی است که در موارد خونریزی های غیر طبیعی زنان کاربرد دارد. علل خونریزی های غیر طبیعی زنان عبارتند از:

تومورهای بدخیم رحمی

2- فیبروم های رحمی (تومورهای خوش خیم رحم)

3- سقط جنین

4- عدم تعادل هورمونی

5- هیپرپلازی آندومتر (رشد بیش از حد لایه داخلی رحم)

6- پولیپ های آندومتر

به طور طبیعی خانم ها در طول دوره باروری خود (12-13 سالگی تا 55-50 سالگی) هر ماه دچار خونریزی می شوند که این خونریزی طبیعی دوره ای، قاعدگی یا عادت ماهیانه نامیده می شود. در هر دوره قاعدگی قسمت اعظم لایه سطحی رحم ریزش کرده و مجدداً بدون هیچ گونه تغییری ساخته می شود.

