

بنام خداوند جان و خرد

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی دنا

بخش آموزش به بیمار

حاملگی نابجا



آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن: 36490411

فاکس: 36490433



حاملگی خارج رحمی

نقاط احتمالی جنین در حاملگی خارج رحمی



موقعیت جنین در رحم
در حالت طبیعی

شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	حاملگی نابجا
تهیه کننده	مرضیه کمالی
سمت	کارشناس مامایی
پزشک تایید کننده	دکتر سرور
ناظر کیفی	م. برومند (سوپروایزر ارتقاء سلامت)
بازنگری	بهار 1400
تحت نظارت و مشاوره دفتر مدیریت کیفیت بیمارستان دنا	

منابع:

مامایی و بیماری های زنان دتفورت



درمان:

درمان طبی داروی متوترکسات

درمان جراحی:

برداشتن لوله رحم

بازکردن لوله و خارج کردن توده و بخیه زدن محل

توده کمتر از 2سی سی در یک سوم دیستال لوله

فالوپ واقع هستند.

**حساسیت شکمی و لگنی:**

در مراحل اولیه حاملگی نابه جا که هنوز پارگی رخ نداده است

حساسیت ناشایع است در صورت وقوع پارگی در هنگام

معاینه شکمی و واژینال و در هنگام حرکت دادن سرویکس

حساسیت بسیار شایع ایجاد می شود.

علائم حیاتی در صورت خونریزی در ضمن پارگی لوله به

صورت افت فشارخون و کاهش فرمان قلب می باشد.

بتاهش سی جی: که در 99 درصد موارد مثبت می شود.

سونوگرافی : واژینال - شکمی

لاپاراسکوپي - لاپاراتومی

تغییرات نابجای پروژسترون سرم

**حاملگی نابجا**

اگر لانه گزینی در هر جایی به جز لایه داخلی رحم صورت بگیرد آن را حاملگی نابجا می نامند.

بعد از ابتلا یک مورد حاملگی نابجا احتمال ابتلا به حاملگی

نابجای بعدی تقریباً 10 درصد است

عواملی که باعث حاملگی نابجا می شوند:

حاملگی نابه جای قبلی

آسیب دیدگی قبلی لوله های رحم

عقیم ساری لوله ای

سابقه عفونت تناسلی

استعمال دخانیات

چسبندگی دورلوله ای (عفونت بعد از سقط اندومترئوز -

التهاب آپاندیست)

علائم و نشانه ها:

درد لگن و شکمی 95 درصد

خوز

