



مراجعات گرامی

خواهشمند است جهت دستیابی به نتایج قابل قبول علمی و استاندارد و جلوگیری از هر گونه اشتباه موارد ذکر شده در این دفترچه راهنما، قبل از اقدام به هر گونه نمونه گیری آن را به دقت مطالعه فرمائید.

باتشکر

پذیرش آزمایشگاه بیمارستان دنا

آدرس: شیراز، چهار راه ستارخان، کوی دنا،

بیمارستان دنا

تلفن: ۱۷-۳۶۴۹۰۴۱۱

فاکس: ۳۶۴۹۰۴۳۳



جهت آزمایش مدفوع:

- نمونه حتی الامکان کمتر از پنج گرم نباشد.
- در صورتیکه مدفوع خونی یا بلغمی باشد، از قسمت های لوده به خون یا بلغم نمونه برداشت شود.
- در صورت مشاهده انگل کامل یا جزئی از آن، حتی الامکان توسط ظرف به آزمایشگاه رسانده شود.
- نمونه مدفوع به سرعت به آزمایشگاه رسانده شود.



- هر گونه نمونه ای در حداقل زمان ممکن (حداکثر یک ساعت) به آزمایشگاه رسانده شود.
- جهت آزمایش آنالیز اسپرم، حداقل سه روز قبل از نمونه گیری از نزدیکی اجتناب نمایید.
- جهت اندازه گیری آهن خون، از خوردن قرص آهن یا مولتی ویتامین خودداری گردد.
- دقت نمایید که نمونه شما قبل از تحویل به آزمایشگاه دارای نام و مشخصات کامل باشد.
- تاریخ آماده شدن جواب را از مسئول پذیرش آزمایشگاه سؤال کنید.



۱. حفظ آرامش و خونسردی قبل از خونگیری
۲. عدم انجام ورزش های سنگین قبل از نمونه گیری
۳. عدم مصرف دخانیات قبل از نمونه گیری
۴. در صورت استفاده از هر گونه قرص یا دارویی قبل از نمونه گیری، مسئول پذیرش را مطلع فرمائید.
۵. سابقه ضعف و بی حالی بعد از خونگیری را به اطلاع نمونه گیر برسانید.



جهت آزمایش قند، چربی، اوره، اسید اوریک

- یک روز قبل از آزمایش غذای کم چرب میل نمایید و ۱۴-۱۲ ساعت قبل از خونگیری، جز آب ساده چیزی میل نشود.
- جهت آزمایشات 2hpp, 4pm, GTT رعایت دقیق فاصله زمانی از لحظه پایان صبحانه یا نهار تا لحظه خونگیری بسیار الزامی می باشد.
- جهت سایر آزمایشات بیوشیمیایی از قبیل هورمون ها و LFT، ناشتا بودن صبح کافی است.



جهت کشت ادرار:

- مجرای ادرار را با آب و صابون یا پنبه ساوانتی به خوبی شسته و حتی الامکان با آب گرم آب کشی نمایید. سپس قسمت اول ادرار را (به اندازه یکی دو قاشق بزرگ) به دور ریخته و بقیه ادرار را در ظرف مخصوص، جمع آوری و درب آن را محکم بسته و در اسرع وقت به آزمایشگاه تحویل نمایید.
- در صورت استفاده از کیسه ادراری جهت نوزادان، از جدا یا جا به جا نشدن کیسه تا قبل از جمع آوری کامل ادرار جلوگیری شود.
- پس از جمع آوری ادرار نوزاد در کیسه، بلافاصله لبه کیسه را به روی خودش برگردانده، آن را به آزمایشگاه تحویل دهید.